© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Tausch-Catalog

der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

	Mk.
Conus	
cedo nulli, Hws. Ind. oc.	15—25
Cyclotus	
Blanchetianus, Mouss. Brasil.	0,80
Dysoni, Pfr. Mexico	1
Jamaicensis, Chm. Jamaica	0,50-60
Inca, D'Orb Bolivia	0,60-80
minimus, Gundl. Cuba	0,30-40
rugatus, Guppy Trinidad	0,60-80
rugosus, Pfr. Jam.	0,60-90
seminudus, Adms. „	0,50-60
translucidus, Sow. v. trinitensis, Guppy Trinidad	0,40-70
Craspedopoma	
hespericum, Morel. Fayal	0,30-50
lucidum, Lowe Madeira	0,30-50
Cyclophorus	
Beauianus, Petit Guadeloupe	0,40-60
Bensoni, Pfr. Cochinchina	1,50
Borneensis, Mtef. Borneo	1-1,50
campanulatus, v. Mart. Japan	1
Fischeri, Pfr. Ecuador	1,50
malayanus, Bens. Cochin.	1-1,40
plicatus, Gould Samoa-Ins.	0,40-60
Popayanus, Lea Venezuela	0,80-1
Schrammi, Shuttl. Guadel.	0,40-60
strigatus, Gould & v. Samoa	0,40-60
upolensis, Mss. & var. Upolu	0,30-50
Leptopoma	
? glabrum, ? Ins. nova Hib.	0,40
„ v. fasciatum „	1
helicoides, Gratel. Philipp.	0,80
Tomocyclos	
Gealei, Crosse Guatemala	2
simulacrum, Morel. „	1-1,50
Megalomastoma	
antillarum, Sow. Antilles	0,30-45
cylindricum, Ch. Portorico	1,50-2
Pupinella	
rufa, Sow. Japan	0,35
Registoma	
ambiguum, Semp. Luzon	0,25-35
grande, Gray & var. Phil.	0,25-35
Choanopoma	
Blainei, Gundl. Cuba	0,80
fimbratum, Sow. Jamaica	0,30-40
„ v. album „	0,80
hystrix, Wright Cuba	1—2
putre, Gundl. „	1
scabriusculum Jamaica	0,50-70
Ctenopoma	
bilabiatum, D'Orb. Cuba	0,60-70
deficiens, Pfr. „	0,40-50
denegatum, Poey „	0,50-60
echinatum, Gundl. „	0,60-70
enode, „ „	0,40-50
honestum, Poey „	0,40-50
nigriculum, Gundl. „	0,50-60
perspectivum, „ „	0,50-60
pulverulentum, Wright „	0,50-60
rotundatum, Poey „	0,50-60
rugulosum, Pfr, „	0,50-60
Sauvallei, Gundl. „	0,80-1
sculptum, „ „	0,50-60
semicoronatum, Gundl. „	0,50-60
undosum, „ „	0,50-60
Diplopoma architectonicum Gundl. Cuba	0,70-90
Adamsiella	
chordata, Gundl. Cuba	0,40-50

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk.
Grayana, Pfr. Jam.	0,30-40
ignilabris, C. B. Adms. „	0,40-50
variabilis „ &vrs. „	0,30-40
xanthostoma, Sow. Cuba	0,50
Otopoma	
affine, Sow. Mauritius	0,30-40
„ v. bellulum „	0,40
„ v. major „ s.f.	0,40
conoideum, Pfr. „	0,50
coquandianum, Petit. Mdgscr.	2,50
fimbriatum, Lam. Mauritius	0,40
haemastomum, Anth. „	0,40
„ var. fuscum „	0,40
ligatum, Müll. „	0,40
Listeri, Gray & vars. „	0,30-50
„ minor. „	0,20-40
„ „ var. canum „	0,40
„ „ „ fuscum „	0,40
„ „ „ flavum „	0,40
nitidum? „	0,30-40
undulatum, Sow. & var. „	0,40
Cyclostomus	
albus, Sow. Jamaica	0,30-40
articulatus, Gray & v. Rdrguez.	0,80-1,20
Banksianus, Sow. Jamaica	0,30-40
„ v. hyacintum, Ad. „	0,35-45
Barclayanus, Pfr. Maurit.	1-1,20
„ var. flavus „	1-1,20
„ „ peradultus „	1-1,20
„ „ ruber „	1-1,20
„ „ perruber „	1-1,20
Belairi, Petit Mdgscar.	1,30-50
bicarinatus, Sow. „	1,50-2,20
carinatus, Born. Maurit. s. f.	1-1,50
„ minor „ „	0,50-90
Chevalieri, C. B. Adms. Jam.	0,30-40
costulatus, Zgl. Transsylv.	0,20
Cuvieri, Petit Mdgscar.	2—3
elegans, Müll. & vars. Germ. Gallia &c.	0,10
filostriatus, Sow. Mdgscar.	1,30-50
Jayanus, C. B. Ad. Jam.	0,30-40
„ var. rufilabris „	0,40-60
interruptus, V. ? Mauritius s. f.	0,50
levigatus, Webb. Teneriffe	0,35-45
Liénardi, Morel. Maurit. s. f.	0,60-80
madagascariensis, Gray Madagascar	2-2,50
Michaudi, Gratel. Maurit.	1,40-70
nilghericus, Bens. Na. Califor.	1,50
nodulatus, Poey Cuba	0,50
pulchellus, Sow. & vr. Mdgscar	1,50
Rangelinus, Poey Cuba	0,90
rectus, Gundl. „	0,50-60
Rollei, Weinl. & v. minor Hayti	0,20
Storchi, Pfr. Cuba	0,60
sulcatus, Lm. Gallia	0,20
„ v. multisulcatus, Pot. Sicilia	0,25
tricarinatus, Lm. Maurit. s. f.	1-1,50
unicolor, Pfr. „ „	0,30-40
„ v. glaber „ „	0,50-80
„ v. sulcatus „ „	0,60-90
„ v. ponderosus „ „	1
„ v. unifasciatus „ „	0,60-90
„ v. multistriatus „ „	0,60-90
Vignalensis, Wright Cuba †	0,40
zonatus, Petit Mdgscar.	1,20-50
„ „ v. minor „	1
Tudora	
Abtiana, Pfr. Cuba	0,50-60
Adamsi, Pfr. Jamaica	0,50
armata, C. B. Ad. „	0,40-50
Augustae, C. B. Ad. „	0,30-45
„ v. rufilabris „	0,45-55
avena, Sow. „	0,40

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk.		Mk.
columna, Wood Jamaica	0,70	elongatum, Wood Cuba	0,40-50
echinulata?, Wright Cuba	0,80	Emilianum, Weinl. Hayti	0,45
excurrens, Gundl. „	1	erectum, Gundl. Cuba	0,50 60
fecunda, C. B. Ad. Jam.	0,50-60	excisum, „ „	0,60-70
lurida, Gundl. „	0,50-60	Habichi, Weinl. Hayti	1-1,20
megachila, Pot. & M. Curaçao	0,30-45	incrassatum, Wright Cuba	1-1,50
pupoides, Morel. Cuba	0,70-80	lacteum „ „	1,20
tractum?, Gundl. „	0,50-80	latum, Gundl. Cuba	1
umbricola, Weinl. Hayti	0,60-80	marginalbum, Gundl. „	0,60-70
versicolor, Pfr & vars. Jam.	0,40-45	Newcombianum, C. B. Ad. St. Thomas	0,30-40
Leonia		„ v. fuscum S. Jean	0,40-50
mamillaris, Lm. Algeria	0,30-40	obesum, Mnke. Cuba	0,50-60
Blandiella		Ottonis, Pfr. „	0,80
reclusa, Guppy Trinidad	0,30 45	oxytremum, Gundl. „	0,50-60
Cistula		perlatum, Gundl. „	0,50-60
Agassizi, Charp. Cuba	0,50-70	perplicatum, „ „	0,50-60
agrestis, Gundl. „	0,50 60	Pfeifferianum, Poey „	0,75
aripensis, Guppy Trinidad	0,40-50	pictum, Pfr. „	0,60-80
bilabris, Mnke. St. Thomas	0,40-50	„ v. Gouldianum, Poey Cuba	0,60-80
Jimenoi?, Arango Cuba	0,50-60	„ v. Mahogany Gld. „	0,60-80
illustris, Poey „	0,50-60	Poeyanum, D'Orb. „	0,40-50
inculta, „ „	0,70-80	revinctum, Poey „	0,60-70
minima, Gundl. „	0,40-50	revocatum, Gundl. „	0,50-60
pupaeformis, Sow. Anguilla	0,30-45	rubicundum, Morel. Guatem.	0,40-50
rufilabris, Bech St. Croix	0,20-25	rufopictum, Gundl. Cuba	0,50-60
Sauliae, Sow. Jam	0,80-90	semilabre, Lm. Bahamas	0,60-70
Chondropoma		sericatum, Morel. Cuba	0,90
abnatum, Gundl. Cuba	0,40-50	Shuttleworthi, Pfr. & minor Cuba	0,80-1,20
Blauneri, Shutl. Portorico	0,50-60	sinuosum, Wright minor „	0,80
candeanum, D'Orb. Cuba	0,50-60	solidulum, Gundl. „	0,50-60
canescens, Pfr. „	0,50-60	subumbilicatum, Poey „	0,80
claudicans, Poey „	0,60-80	tenebrosum, Morel. „	0,80
crenulatum, Fér. Guadel.	0,40-50	textum, Gundl. „	0,50-60
delatreanum, D'Orb. Cuba	0,50 60	unilabiatum, Gundl. „	0,50-60
dentatum, Say & v. fasciatum Cuba	0,70-80	variatus, West. & B. Canariae	0,50
dilatatum, Gundl. „	0,70-80	violaceum, Pfr. Cuba	0,50-60
discolorans, Wright „	1		
D'Orbignyanum, Petit „	1,30		

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

		Mk.
Pomatias		
auritus, Zgl. Dalmat.	0,10-20	
Canestrinii, Adami Ital. sup.	0,20-30	
cinerascens, Rsm. Dalmat.	0,10-20	
Henrici, Strob. Trentino	0,10-15	
„ var. levis „	0,10-15	
maculatus, Drap. & var. Germ. &c.	0,5-10	
nanus, Wstrld. n. sp. Croatia	0,20-25	
obscurus, Drp. Gallia	0,20	
patulus „ Carinthia	0,10	
tesselatus, Rossm. Corfu	0,20	
turriculatus, Mnke. Dalmat.	0,20	
Trochatella		
petrorsa, Gundl. Cuba	0,25-30	
pulchella, Gray Jamaica	0,10-15	
„ v. parva „	0,15	
Regina, Morel. Cuba	0,60-1,50	
Sloanei, D'Orb. „	0,40-50	
Tankervillei, Gray Jam.	0,80-1,50	
Lucidella aureola, Gray „	0,10-20	
„ „ granulosa, Adms. Jamaica	0,20-30	
Helicina		
acutissima, Sow. Bohol.	0,25-40	
„ var. maxima Philipp.	0,30-45	
Adamsiana, Pfr. Jam.	0,20-25	
alboviridis, Wright „	0,25-30	
ackaensis, Bldfd. Ins. Andam.	0,25	
anaaensis, Mouss. Ins. Anaa	0,30	
Andamaaica, Bens. Andam.	0,35	
barbata, Guppy Trinidad	0,30	
aurantia, Gray Jam.	0,30	
Bayamensis, Poey Cuba	0,50-80	
bellula, Gundl. „	0,50	
„ var. „	0,50	
beryllina, Gould Viti. I.	0,25	
calida, Weinl. Bahama	0,25	
? Cookensis ? Insula Cook	0,20	
declivis, Gundl. Cuba	0,35	
elongata, D'Orb. „	0,35	
festa, Gundl. „	0,35	
flavescens, Pease Ins. Rarotinga	0,30	
fusca, Wright Cuba	0,35	
fuscula, Gundl. „	0,30	
gonostoma, „ „	0,30-40	
granum, Pfr. „	0,30	
jamaicensis, Sow. Jamaica	0,25	
jugularis, Poey Cuba	0,40-50	
marginata, Gundl. „	0,30-45	
Maugeriae, Gray Ins. Raiatea	0,30-50	
megastoma, Adms. Jamaica	0,30-40	
modiana, Gassies Na. Caledon.	0,10-15	
nodoe, Arago Cuba	0,30-40	
montana, Wright „	0,25-30	
musica, Gould Ins. Samoa	0,30	
neritella, Lam. Jamaica	0,25	
orbiculata, Say Florida	0,20	
Oweniana, Pfr. Guatemala	0,30-40	
picta, Sow. Guadeloupe	0,25-35	
pisum, Phil. Ins. Sandw.	0,25	
portoricensis, ? Porto rico	0,25	
pulcherrima, Lea Cuba	0,60-80	
Rohri, Pfr. Ins. Marquesas	0,30	
Rolvis, „ Ins. Bona bona	0,30-35	
rostrata, Morel. Guatemala	0,40-50	
rubicunda, Gundl. Cuba	0,30	
rubicunda, Pease I. Raiatea	0,50	
rubella, Wright Cuba	0,35	
rubromarginata, Gundl. „	0,30-35	
rugosa, Pfr. Hayti	0,30-35	
Sagraiana, D'Orb. Cuba	0,60-90	
spectabilis, Gundl. „	0,30-40	
sphaeroidea, Pfr. Ins. Loyalty	0,35-45	
straminea, Morelet Cuba	0,25-35	
subdepressa, Poey „	0,30-35	
† subfusca, Mnke. St. Thomas	0,15-20	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk.		Mk.
subglobulosa, Poey Cuba	0, 2535	litoralis, Gundl. Cuba	0,25-30
submarginata, Gray „	0,2535	major, Gray Jam.	0,40-60
? Tahitensis? Tahiti	0,25	megastoma, Adms. „	0,25-35
trochulina, D'Orb. Porto rico	0,25-35	minima, D'Orb. Cuba	0,20-30
variabilis, Wagn. Brasil.	0,30-40	palliata, C. B. Adms. Jam.	0,30-40
vernalis, Morel. Guatemala	0,35-45	„ var. labrosa „	0,35-45
vinosa, Shuttl Portorico	0,25-35	Proserpina, nitida, Sow. Jam.	0,35-45
Vitiensis, Mouss. Ins. Viti	0,25-30	*Asiminea*	
? Wallisiensis? Ins. Wallis	0,25-30	atomaria, Mühlf. Amazon. St.	0,25
Alcadia		Eliae, Paladhile, Bayonne	0,15
Brownii, Gray Jamaica	0,25-30	Francisi, Bens. Moulmein	0,25
concinna, Gundl. Cuba	0,30-35	Grayana, Leach,	
exserta, „ „	0,25-35	Thamisa infer.	0,20
hispida, Pfr. „	0,20-25	nitida, Pse. Ins. Huahine	0,25
Hollandi, C. B. Adms. Jam.	0,25-30	orata „ „ Cook	0,25
incrustata, Gundl. Cuba	0,35-45	vitiensis, Gdl. Viti I.	0,30

T. A. Verkrüzen,
Brönnerstrasse 30 II., früher Oederweg 96, Frankfurt a. M.

Gesellschafts-Angelegenheiten.

Für die Bibliothek eingegangen:

Koch, F. E., über die Classificirung der Pleurotomidae. — Vom Autor.

Verhandlungen des Vereins für naturwissenschaftliche Unterhaltung in Hamburg. 1876.

Jahresbericht der zoologischen Section des Westfälischen Provincial-Vereins für Wissenschaft und Kunst für das Etatsjahr 1878—1879. — Von Herrn P. Hesse.

Museum Godeffroy Catalog VII. — Von Herrn Schmeltz.

Proceedings of the Academy of Natural-Sciences of Philadelphia. 1878.

Redigirt von Dr. W. Kobelt. — Druck von Kumpf & Reis in Frankfurt a. M.
Verlag von Alt & Neumann in Frankfurt a. M.